

LE DIABÈTE



Type 1

Le pancréas ne fonctionne plus. On doit alors s'injecter de l'insuline, ou porter une pompe à insuline pour vivre normalement. Il faut aussi vérifier la glycémie régulièrement.


HYPOGLYCÉMIE



Il n'y a PLUS ASSEZ de sucre dans le sang.

SYMPTÔMES :

- Pâleur
- Tremblements
- Énervement
- Vertiges
- Faim
- Fatigue
- Hallucinations
- Vision trouble



QUE FAIRE ? RESUCRER !

- Sucre en morceaux
- Jus de fruits
- Sirop, boisson sucrée
- Pâtes de fruits

POURQUOI ?

Elle peut être provoquée par une dose d'insuline trop importante, un repas sauté, du sport imprévu ou une activité forte, etc.

HYPERGLYCÉMIE



Il y a TROP de sucre dans le sang.

SYMPTÔMES : Vision trouble, maux de tête, déshydratation, envie d'aller aux toilettes, etc.

QUE FAIRE ? Il/elle ou l'infirmière doit injecter de l'insuline pour corriger l'excès de sucre. Le/la laissez boire et aller aux toilettes le temps que son taux de sucre baisse.

POURQUOI ?

Elle peut être provoquée par une dose d'insuline trop faible, une activité sportive annulée, etc.

Et si tu penses que quelque chose cloche chez ton ami(e), parles-en de suite à ton enseignant(e) !